
	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 1	di 8


***: criteri modificati.**

SOSPENSIONI

ABORTO	6 mesi dall'evento
AFFEZIONI gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche, immunologiche, renali, metaboliche, respiratorie	esclusione se affezione attiva, cronica o recidivante
AGOPUNTURA	nessuna (se effettuata con aghi monouso) altrimenti 4 mesi
ALCOOLISMO	definitiva
ALLERGIA - a farmaci - stagionale - vaccini desensibilizzanti	- due mesi dall'episodio - durata, sospensione se anche sintomi modesti - 3 giorni dall'ultima dose
ALTERAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE	-da valutarsi con cardiologo AVS
ASBESTOSI	definitiva
ASMA CRONICA (in trattamento)	definitiva
AUTOIMMUNITA' (malattie autoimmuni)	definitiva
BPCO	definitiva
BRUCELLOSI	due anni dalla guarigione
BABEBIOSI	definitiva
CARDIOPATIA ISCHEMICA	definitiva
CALO PONDERALE NON MOTIVATO	sospensione in attesa di accertamenti
CITOMEGALOVIRUS	sei mesi dalla guarigione
COMPORTAMENTI SESSUALI - cambio partner (partner stabile) - partner occasionale - partner affetto od a rischio di HIV-HBV-HCV - comportamenti sessuali ad alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili con sangue	- quattro mesi da inizio relazione sessuale - quattro mesi dall'ultima esposizione al rischio - quattro mesi dal termine del rapporto - definitiva
CONTATTI CON MALATTIE ESANTEMATICHE	quattro settimane
CONVIVENZA CON PORTATORI DI EPATITE - epatite B - epatite C - <i>Donatori partner o conviventi di soggetti con sierologia con positività aspecifica:</i>	- sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -sospensione fino a 4 mesi dalla fine convivenza -idoneità

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data: 11.10.23	Rev. 13
		Pag. 2	di 8


CHAGAS (malattia)	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - Soggetti nati (o da madre nata) in zone ad endemia di Chagas, o trasfusi in questi paesi, o che hanno soggiornato in aree a rischio (rurali, trekking, camping) possono donare solo in presenza di un test negativo per Ab vs Chagas
CREUTZFELD-JACOB DISEASE - Trapianto di cornea, somministrazione di ormone della crescita ricavato da ipofisi umana, casi familiari della malattia, farmaci con estratti bovini. - Soggiorno nel Regno Unito per 6 mesi continuativi o cumulativi nel periodo 1980-1996 - Trasfusioni ricevute o interventi chirurgici nel Regno Unito dopo il 1980	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - definitiva - definitiva - definitiva
DIABETE MELLITO*	<ul style="list-style-type: none"> - sospensione definitiva per diabete I insulino-dipendente - terapia con semaglutide o analoghi: sospensione definitiva - idoneità se forme compensate solo con dieta e valori glicemia basale < 130 mg/dl - idoneità se in terapia con antidiabetici orali, se in buon compenso glicemico ed esclusi danni d'organo (previa visione da parte del medico AVIS di documentazione del Centro antidiabetico)
DENTISTA - CURE ODONTOIATRICHE - ablazione tartaro, otturazioni - se presente ferita (es. estrazione, implantologia)	<ul style="list-style-type: none"> - 2 giorni - una settimana dalla guarigione della ferita
DIFETTI CARDIACI (es. DIV, ANCHE SE CORRETTI CHIRURGICAMENTE) Ad eccezione: DIA CORRETTO CHIRURGICAMENTE	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - da valutare con consulenza cardiologica AVIS

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 3	di 8


PFO	12 mesi dopo intervento
DISENDOCRINIE*	<ul style="list-style-type: none"> - definitive se in trattamento ed a patogenesi autoimmune (se pluriorgano) -ipotiroidismi: possibile riammissione se eutiroidismo (TSH normale) anche se in terapia sostitutiva -ipertiroidismo: sospensione definitiva
DROGA - leggera (solo hashish e/o marijuana) - pesante	<ul style="list-style-type: none"> - sei mesi dallo stop assunzione - definitiva se per via parenterale o tossicodipendenza -valutare dopo un anno dallo stop consumo, solo per droghe chimiche o cocaina, se uso sporadico (inteso come <3 volte e non protratto per un tempo determinato)
ECOGRAFIA TRANSLUMINALE	idoneo
EMBOLIA POLMONARE	definitiva (se primitiva o trombofilia)
EMOGLOBINA (livelli di)	<ul style="list-style-type: none"> -sangue intero : ≥ 13.5 M ; ≥ 12.5F - plasmaferesi: ≥ 12.5 M ; ≥ 11.5 F
ENDOSCOPIA	quattro mesi
ENTEROPATIA DA GLUTINE (CELIACHIA)	Idoneità solamente se dieta priva di glutine; se dieta libera: sospensione definitiva
EPATITE A EPATITE B anche pregressa	<ul style="list-style-type: none"> - 4 mesi dalla guarigione - definitiva
EPATITE C EPATITE da eziologia indeterminata	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - definitiva
ESANTEMATICHE (malattie esantematiche)	15 giorni dalla guarigione
EPILESSIA	Esclusione. Idoneità se assenza di convulsioni da più di 3 anni
ESPIANTO DI MIDOLLO (donazione di sangue midollare o di cellule staminali da sangue perif.)	un anno
ETA' - sangue intero (periodici)	<ul style="list-style-type: none"> - ≥ 18 anni, fino a 65 anni - da 65 anni (compiuti) a 70 anni (compiuti): donazione ogni 6 mesi

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 4	di 8


- sangue intero (accettazione nuovi donatori)	- ≥18 anni, fino a 60 anni
- aferesi (periodici)	- ≥18 anni, fino a 60 anni - da 60 anni (compiuti) a 67 anni (compiuti): donazione ogni 3 mesi
FARMACI	
- antiinfiammatori FANS	- 5-7 giorni (se assunti per algie isolate: idonei - donazioni feriali: segnalazione NO PLT)
- antibiotici orali	- 15 giorni
- antibiotici parenterali	- 30 giorni
- antidepressivi	- 30 giorni
- cortisonici	- 15 giorni
- antistaminici	- 10 giorni
- H2 bloccanti / inibitori pompa protonica	- 5 giorni
- ansiolitici / ipnoinduttori	- 3-7 giorni
- eparina	- 15 giorni
- finasteride	- 60 giorni
- dutasteride	- 180 giorni
- antagonisti recettori alfa	- nessuna sospensione
- statine	- 5 giorni
- terapia ormonale sostitutiva per menopausa	- nessuna sospensione
- estroprogestinici orali	- nessuna sospensione
- ormoni tiroidei	- definitiva se pat. autoimmune pluriorgano
- beta bloccanti	- idoneo solo per plasmaferesi per aspirante donatore e donatore periodico che inizia la terapia; - nessuna sospensione per donatore periodico già in terapia da diversi anni (sospensione se episodi vaso-vagali post donazione)
- acitretina (Neo Tigason)	- un anno
- altri retinoidi (Roaccutan)	- 1 mese
- utilizzo anche pregresso, per via I.M-E.V, di steroidi anabolizzanti o EPO (doping)	- definitiva
- venoprotettori (es.diosmina)	- 5 giorni
FEBBRE > 38 C°	due settimane dopo la cessazione dei sintomi
FEBBRE Q	2 anni dalla guarigione
FILARIOSI	definitiva
FORO ORECCHINO	quattro mesi (idoneità se utilizzati strumenti a perdere)
GASTRORESEZIONE PARZIALE PER ULCERA PEPTICA	- idoneo per plasmaferesi; sospensione sangue intero da valutare in base al bilancio del ferro

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 5	di 8

GLAUCOMA	nessuna sospensione
GLOMERULONEFRITE ACUTA	cinque anni dalla guarigione
GLOMERULONEFRITE CRONICA	definitiva
HERPES SIMPLEX	- una settimana dalla guarigione
HERPES ZOOSTER	- due settimane dalla guarigione
HTLV I/II	definitiva
IMMUNOGLOBULINE	quattro mesi
INCIDENTE SANITARIO (BIOLOGICO)	quattro mesi
INFARTO MIOCARDICO ACUTO – ANGINA	definitiva
INFLUENZA	due settimane dalla guarigione
-INTERVENTI CHIRURGICI (in anestesia generale o spinale) <i>ad eccezione taglio cesareo: 6 mesi</i>	-quattro mesi
- INTERVENTI CHIRURGICI CON TRASFUSIONI AUTOLOGHE O OMOLOGHE - INTERVENTI CHIRURGICI IN AN. LOCALE	- quattro mesi, compatibilmente con la patologia di fondo - un mese (previa visione es. istologico se eseguito su neoformazioni)
INTERVENTI OCULISTICI CON LASER (CORREZIONE MIOPIA, CATARATTA SENILE)	due mesi (fine trattamento con collirio per tono oc.)
IPERTENSIONE ARTERIOSA	- range accettabilità: <ul style="list-style-type: none"> • P.A max: <180 mmHg • P.A min: <100mmHg
IPERTENSIONE IN TERAPIA	- v. voce “farmaci”
ISCHEMIA/ EMORRAGIA CEREBRALE – TIA	definitiva
LEBBRA	definitiva
LEISHMANIOSI	definitiva
LYME (malattia di Lyme)	12 mesi dalla guarigione

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 6	di 8

MALARIA (malattia)	<ul style="list-style-type: none"> - idoneità 6 mesi dalla guarigione, in presenza di test negativo per Ab vs malaria, oppure solo plasmateresi - soggetti che hanno vissuto in qualsiasi momento della loro vita per almeno 6 mesi continuativi in aree endemiche: idoneità per sangue intero solo dopo test immunologico (negativo) - soggetti che hanno soggiornato in aree endemiche: idoneità trascorsi 6 mesi dal rientro, in assenza di episodi febbrili e con test immunologico negativo
MALATTIE AUTOIMMUNI	Definitiva se pluriorgano (ad eccezione della celiachia ,se dieta priva di glutine)
MALATTIE EMATOLOGICHE <ul style="list-style-type: none"> - Neoplasie (comprese malattie mieloproliferative: policitemia vera, trombocitemia essenziale, LMC, mielofibrosi) - coagulopatie sintomatiche - talassemia - trait talassemico - favismo - gammopatia monoclonale (comprese MGUS) 	<ul style="list-style-type: none"> -definitiva - definitiva - definitiva - idoneità solo plasmateresi ,se Hb a livelli adeguati - idoneità per plasmateresi (non ad uso clinico) - definitiva
MALATTIE INTESTINALI CRONICHE (CROHN, RETTOCOLITE ULCEROSA)	definitiva
MALATTIE NEUROLOGICHE DEGENERATIVE (SLA, SM, PARKINSON...)	definitiva
MALATTIE PSICHIATRICHE <ul style="list-style-type: none"> - depressione - psicosi 	<ul style="list-style-type: none"> - guarigione - definitiva
MALATTIE VENEREE -LUE -ALTRE	<ul style="list-style-type: none"> -definitiva -valutazione in base all'anamnesi (vd comportamenti sessuali a rischio)
MESTRUAZIONI	idoneità se non dismenorrea o menorragia
MONONUCLEOSI	sei mesi dalla guarigione
NEOPLASIE MALIGNI -eccezione: carcinoma basocellulare,	<ul style="list-style-type: none"> - definitiva - 4 mesi dall'asportazione

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 7	di 8

CIN 3 al Pap-test	da valutare dopo follow-up (1 anno)
OSTEOMIELITE	due anni dalla guarigione
PARTO	sei mesi
PIERCING	quattro mesi
PESO CORPOREO	superiore a 50 Kg (<i>anche per aferesi!</i>)
PUNTURA DI ZECCA	tre mesi
REUMATISMO ARTICOLARE ACUTO (MALATTIA REUMATICA)	due anni dalla guarigione
RENE POLICISTICO	definitiva
SARCOIDOSI	definitiva
SIFILIDE ACCERTATA ANCHE PREGRESSA	definitiva
SILICOSI	definitiva
STRANIERI (o ITALIANI nati all'estero o con soggiorno prolungato all'estero)	<ul style="list-style-type: none"> - idonei se discreta padronanza della lingua italiana, residenza regolare, documenti di identità e codice fiscale - se nati o vissuti per oltre 6 mesi in zone ad endemia malarica: idonei sangue dopo 6 mesi solo se Ab vs malaria negativi
TATUAGGI-TRUCCO PERMANENTE	quattro mesi
TIFO O SALMONELLOSI	un anno
TOSSICODIPENDENZA - DROGHE PESANTI VIA PARENTERALE - COCAINA	definitiva definitiva
TOXOPLASMOSI	sei mesi dalla guarigione clinica
TRAPIANTI DI CELLULE O TESSUTI	quattro mesi
TRAPIANTO D'ORGANO (compreso trapianto di cornea)	definitiva
TRAPIANTO DI TESSUTO OSSEO AUTOLOGO OD OMOLOGO	4 mesi
TRASFUSIONI - INFUSIONE EMODERIVATI	quattro mesi
DONATORI CON PARTNER TRASFUSO	quattro mesi
TRASFUSIONI EFFETTUATE NEL REGNO UNITO DAL 1980 AL 1996	definitiva
TRIPANOSOMIASI	definitiva
TUBERCOLOSI	due anni dalla guarigione

	PROTOCOLLO	PROT. AVISBG 04	
	Criteria Sospensioni <i>documento a scopo di consultazione solo per donatori, per dubbi contattare il medico AVIS</i>	Data:11.10.23	Rev. 13
		Pag. 8	di 8

ULCERA PEPTICA	- sospensione fino a completa guarigione - se positività HP: un mese dal termine terapia eradicante, in assenza di sintomi
VACCINAZIONI - vaccini vivi o attenuati (BCG, antipolio orale Sabin, antivaaiolo, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla, antitifica) - vaccini uccisi, inattivati, tossoidi (antiepatite A, antitetanica, antiinfluenzale, antipolio parenterale –Salk-, antirabbia –profilassi-, antimeningococco, antipneumococco) - Vaccino anti epatite B - vaccino anti rabbia dopo morso di animale	- quattro settimane - 48 ore se apiressia -7 giorni - 12 mesi
VIAGGI EXTRA-EUROPA	Vd. Doc AVIS BG 05
VIRUS DEL NILO OCCIDENTALE:	Sospensione per 28 giorni dal rientro da zona in cui sono stati osservati casi. Se malattia: 4 mesi di sospensione dalla risoluzione dei sintomi
XENOTRAPIANTO	definitiva

Approvato dal Resp. Raccolta AVIS Prov. BG.....*B. Cej...*

Riferimenti:

- *D.M 02/11/15” Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”

*Prot03DMTEBG “Criteri di selezione del donatore”-